

## NUEVOS REGISTROS DE LA FAMILIA ORCHIDACEAE EN CUBA

JUAN A. LLAMACHO OLMO

Instituto de Ecología y Sistemática (IES). Carretera de Varona Km 3 1/2  
Capdevila, Boyeros, Ciudad de la Habana. Cuba.  
botanica.ies@ama.cu / llamacho@yahoo.com

ABSTRACT. Two species of Orchidaceae are first recorded from Cuba: *Dendrophylax barrettiae* and *Triphora surinamensis*.

RESUMEN. Se dan a conocer dos nuevos registros de la familia Orchidaceae en Cuba: *Dendrophylax barrettiae* y *Triphora surinamensis*.

PALABRAS CLAVE / KEY WORDS: Orchidaceae, *Dendrophylax barrettiae*, *Triphora surinamensis*, Cuba

Como parte de la realización del libro “Cuba y sus Orquídeas”, fueron visitadas varias regiones de la isla, con el objetivo de ilustrar la diversidad de este grupo de plantas. Se encontraron dos nuevos registros para la flora orquídea de la mayor de las Antillas.

En octubre del 2002 se visitó la costa norte de la provincia de Holguín. En la manigua costera se encontró una especie afila que corresponde a *Dendrophylax barrettiae*. Esta planta ya se había encontrado en el área en 1997, pero era un ejemplar muy joven con una inflorescencia que tenía sólo una flor, lo que no aportaba mucho para la correcta identificación de esta especie. También se había publicado una fotografía de esta especie con el nombre *Dendrophylax lindenii* (como *Polyradicion lindenii*), por Marta A. Díaz en 1985, pero sin hacer referencia a ningún material de herbario (Díaz 1985).

***Dendrophylax barrettiae*** Fawc. & Rendle, J. Bot. 47: 266. 1909.

DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA: Jamaica (Adams 1972).

DISTRIBUCIÓN EN CUBA: Costa norte de Las Tunas-Holguín, Oriente.

ECOLOGÍA: Epífita en arbustos, manigua costera (matorral xeromorfo costero), de 0 a 20 m. Florece desde septiembre hasta diciembre.

TESTIGO: CUBA. Holguín: Guardalavaca, El Cayuelo, 14 de noviembre del 2002, J. Llamacho y A. González (HAC-42099), epífita en manigua costera.

En julio del 2003 se realizó una expedición a la región de Baracoa, casi en el extremo oriental de la isla, en la escalada a Alto Iberia, donde se encontraron varios ejemplares de *Triphora surinamensis* Lindl., en zonas parcialmente inundadas.

***Triphora surinamensis*** (Lindl.) Britton, Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands 5: 184. 1924.

DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA: Brasil (Amazonas), Colombia, Guyana Francesa, Guyana, Isla Española, Jamaica, Antillas Menores, Puerto Rico, Surinam, Trinidad y Venezuela (Ackerman 1997).

DISTRIBUCIÓN EN CUBA: Alto Iberia, Macizo montañoso Moa-Baracoa, Oriente.

ECOLOGÍA: Planta terrestre en zonas muy húmedas del bosque pluvial, asociada a musgos del género *Sphagnum*. Florece en julio y agosto.

TESTIGO: CUBA. Guantánamo: Baracoa, Alto Iberia, 16 de julio del 2003, J. Llamacho (HAC-42100).

### LITERATURA CITADA

- Ackerman, J. 1997. An Orchid flora of Puerto Rico and the Virgin Islands. Mem. New York Bot. Gard. 73.  
Adams, C.D. 1972. Flowering Plants of Jamaica. University of the West Indies.  
Díaz, M. A. 1985. Las orquídeas nativas de Cuba. Editorial Científico Técnica. Cuba.